

شعبة المعلومات الدوائية / الصيدلة السريرية

تعرف على دوائك

ما هي قطرة بريدينيزولون أسيتيت العينية (Prednisolone acetate eye drop) ؟

- هي قطرة من فئة الكورتيكوزون مضادة للالتهابات الموضعية.
- تقلل التهيج و الحرقه و الاحمرار و الانتفاخ و الألم المصاحب لالتهاب العين الناتج عن الكيماويات ، الحرارة ، الإشعاع، الحساسية أو الأجسام الغريبة في العين.

دواعي الاستعمال:

- تستخدم القطرة لعلاج التهابات العين مثل قرحة القرنية و التهابها و التهاب الملتحمة و القرحية.

الأشكال الدوائية:

قطرة عينية (معلق عيني) بالتراكيز التالية:

- ١٢,٠% (٥ مل، ١٠ مل).
- ١% (٥ مل، ١٠ مل).
- ١,٢ مغ/مل (٥ مل، ١٠ مل).

الجرعات:

- الجرعة المعتادة هي نقطة واحدة أو نقطتين في العين المصابة مرتين إلى أربع مرات يوميا.
- خلال أول ٢٤-٤٨ ساعة ، يمكن زيادة عدد مرات اعطاء الدواء اذا احتاج المريض .

ماذا تفعل في حال نسيان الجرعة ؟

إذا نسيت أن تتلقى إحدى الجرعات عليك بتقطيرها مجرد أن تتذكرها ثم استعمل أي جرعات متبقية لهذا اليوم على مسافات زمنية متساوية. و لكن إذا كان موعد الجرعة التالية قد اقترب عليك بإلغاء الجرعة المنسية و أن تستمر بعد ذلك طبقاً لنظامك المعتاد.

طريقة تخزين الدواء:

- يحفظ الدواء في مكان آمن بعيداً عن متناول الأطفال.
- يخزن في درجة حرارة ١٥-٢٥ درجة مئوية بعيدا عن الرطوبة والحرارة ويمنع

شعبة المعلومات الدوائية / الصيدلة السريرية

تعرف على دوائك

التجميد.

- حافظ على بقاء العبوة مغلقة بإحكام.
- تخلص من العبوة بعد مرور ٢٨ يوم من فتحها حتى إذا كان بها محلول متبقي.

* طريقة أخذ الدواء:

١. اغسل يديك جيداً بالماء و الصابون قبل الاستعمال.
٢. رج القطرة جيداً قبل الاستعمال.
٣. أمل رأسك إلى الخلف و انظر إلى السقف.
٤. اسحب الجفن السفلي برفق إلى الأسفل بحيث يتكون جيب صغير (كما هو موضح في الصورة).
٥. اضغط على القطارة المقلوبة بحيث تنزلق نقطة إلى عينك، و لا تدع القطارة تلامس عينك أو أي شيء آخر.
٦. اترك الجفن السفلي و أغمض عينك لمدة ٣٠ ثانية و اضغط برفق على مدمع العين بالإصبعين السبابة و الإبهام لمدة دقيقة إلى دقيقتين.



٧. إذا كانت الجرعة المحددة لك قطرتين باعد بين القطرة و الأخرى مدة دقيقة إلى دقيقتين تقريباً. و إذا كنت تستخدم نوع آخر من القطرات العينية باعد بينها و بين قطرة البريديزولون ما يقارب ٥ دقائق.
٨. التزم بدقة التعليمات المدونة في الوصفة الطبية. لا تستعمل هذا الدواء بشكل أكثر أو أقل تكراراً أو لفترة أطول من تلك المحددة لك.

ملاحظة: لا يجب استخدام هذا المستحضر أثناء ارتداء العدسات اللينة لذلك يجب إزالتها قبل استخدام الدواء و ألا تعاد إلى العين إلا بعد مرور ١٥ دقيقة من وضع الدواء.

شعبة المعلومات الدوائية / الصيدلة السريرية

تعرف على دوائك

* الآثار الجانبية للدواء :

- حرقان بالعين.
- تهيج و حكة و احمرار.
- عدم وضوح في الرؤية.
- ارتفاع الضغط داخل العين.
- قد يؤدي الاستعمال المطول لهذا الدواء لنمو جراثيم أخرى .

* الاستعمال في حالة الحمل و الإرضاع

- لا توجد دراسات كافية حول استخدام هذا الدواء للمرأة الحامل أو المرضعة حيث أن نسبة الدواء التي قد تصل إلى الجنين عن طريق الدم أو للطفل عن طريق الحليب غير معروفة لذا لا يفضل استخدامه.

* التداخلات الغذائية و الدوائية مع الدواء

قد يتداخل هذا الدواء مع قطرات مضادات الالتهابات الغير ستيرويدية (مثل ديكلوفيناك، كيترولاك) حيث انها تزيد الآثار الجانبية للكورتيزون وتؤثر على عملية شفاء العين، لذلك تجنب استخدامهما معا .

* لا تستخدم هذا الدواء إذا كنت تعاني من:

- حساسية لهذا النوع من الكورتيزون أو أي نوع كورتيزون آخر.
- عدوى فيروسية أو فطرية أو بكتيرية شديدة في العين.

شعبة المعلومات الدوائية / الصيدلة السريرية

تعرف على دوائك

* تحذيرات:

- هذا الدواء لاستعمالك أنت وحدك ولا تعطه لأي شخص آخر إذ أنه قد يسبب له الألم حتى إذا كانت أعراضه مشابهة لأعراضك.
- إذا مر يومين على استعمال الدواء ولم تشعر بتحسن عليك مراجعة الطبيب مباشرة.
- لا توقف العلاج بشكل مفاجئ خصوصاً إذا كنت تستخدمه لفترة طويلة، وإنما يجب إيقافه بشكل تدريجي.
- فترة العلاج تختلف باختلاف نوع الإصابة فيمكن أن تمتد من أيام إلى أسابيع حسب استجابة المريض.
- راقب وضع العين باستمرار و راجع الطبيب في حال الشعور بعدم التحسن أو تفاقم الأعراض أو التغيير في مستوى الرؤية.
- إذا ظهرت أية آثار أخرى غير معتادة أو غير متوقعة، أو في حال سببت هذه القطرة لسعاً أو حرقاً شديداً أو استمرت لفترة طويلة استشر طبيبك حالاً.
- لا تستعمل الدواء إذا كانت فوهة القطرة أو غطائها مكسور.
- لا تستعمل هذا الدواء بعد تاريخ انتهاء الصلاحية، و هو مطبوع على ملصق العبوة.

إعداد الدكتورة الصيدلانية : روان الفران.

و الدكتورة الصيدلانية : دانية النوتي.

بإشراف الدكتورة الصيدلانية : إشراق العبويني.